2xEDmini csomagolás

stanc méret: 446x302mm

2022.03.29.

TOXBOX Brodifakum hatóanyag tartalmú rágcsálóirtó pép + egéretető csalétekállomás

Ettől eltekintve, ne tisztítsa meg a fertőzött területet a kezelés előtt közvetlenül, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.
- A termék kizárólag integrált kártevőirtási rendszer (IPM) keretében használható, beleértve többek között a higiénés intézkedéseket és – ha lehetséges – a fizikai védekezési módszereket.
- Kövesse a vonatkozó helyi előírásokban/helyes kártevőirtási gyakorlatban szereplő további útmutatásokat.
- Az etetőállomásokat annak a helynek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol rágcsálói aktivitást figyeltek meg (például vonulási útvonalak, lészkek, lyukak, üregek stb).
- Védje a csalétket az időjárás viszontagságaitól. Az etetőállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezze ki.
- Cseréljen ki az etetőállomásban minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált, vagy amely elszennyeződött.
- Ahol lehetséges, az etetőállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.
- Az etetőállomáson egyértelműen fel kell tüntetni, hogy rágcsálóirtót tartalmaz, és nem szabad mozgatni vagy lehnyíni.
- Ha a terméket nyilvános helyen alkalmazzák, a területen figyelmeztetéseket kell kihelyezni, amelyek értesítenek az elsődleges és másodlagos mérgezés veszélyéről és a mérgezés esetén szükséges óvintézkedésekről.
- A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy ne lehessen elvinni az etetőállomásról.
- A terméket gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb nem célzott állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezze el.
- A terméket élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezze el.
- Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék alkalmazása során.
- A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termék alkalmazása után mosson kezet, és mossa meg a termékkel közvetlenül érintkező bőrfelületet.
- A kezelt területek ellenőrzésének gyakorisागát a kezelést végző személy határozza meg a kezelés kezdetén végzett felmérés alapján. Ez gyakoriságnak összhangban kell állnia a vonatkozó helyes gyakorlati kódex által adott ajánlásokkal.
- Ha a csalétek felvétele a fertőzöttség nyilvánvaló méretéhez képest alacsony, vegye fontolóra az etetőállomás áthelyezését másik helyre, valamint másik csalétek formuláció választását.
- Ha a 35 napos kezelési időszak után a csalétket továbbra is fogyasztják, és nem csökken a rágcsálói aktivitás, meg kell állapítani a valószínű okot. Amennyiben minden más okot kizárt, valószínű, hogy vannak rezisztens rágcsálók, így vegye fontolóra nem véralvadásgátló rágcsálóirtó, amennyiben rendelkezésre áll, vagy erősebb véralvadásgátló rágcsálóirtó használatát. Alternatív védekezési intézkedésként vegye fontolóra csapdák alkalmazását.
- A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó csalétket vagy az etetőállomásokat.
- Kiszerelésre vonatkozó külön előírás: tasakos kiszerelések esetén a tasakokat ne nyissa fel, felnyitás nélkül kell kihelyezni.

Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések:
Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetleges közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének felhasználói) a rágcsálóirtásról.
- Végye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.
- A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.
- Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiségel. Ne alkalmazza a terméket közvetlenül üregekben.
- Kizárólag olyan csatornahálózatban helyezze ki a terméket, amely kapcsolódik a szennyvíztisztító telephez.
- Ne használja olyan területen, ahol gyanítható, hogy a hatóanyag elleni rezisztencia áll fenn.
- A rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ne használjon felváltva hasonló vagy kisebb hatékonyságú véralvadásgátlókat! Váltott alkalmazáshoz más hatásmechanizmusú rágcsálóirtószert – ha elérhető –, vagy nagyobb hatékonyságú véralvadásgátló hatóanyagot használjon.
- A csalétekállomásokat és a kihelyezéshez használt szerszámokat két alkalmazás között ne mossa ki vízzel.
- A szakképzett foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók termeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.
- Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni"; "rágcsálóirtószert tartalmaz"„baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz. (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)", továbba a 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet előírásaival összhangban az alkalmazott rágcsálóirtó szer megnevezése, hatóanyaga, az ellenmérgy, vagy gyógyszer megnevezése és a szolgáltató neve, címe, telefonszáma.
- Ha az etetőhelyeket felszíni vizek (például folyók, tavak, vízesárkok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.
- Csatornarendszerben történő alkalmazáskor a csalétket úgy kell kihelyezni és rögzíteni, hogy a víz / szennyvíz ne érhesse el vagy moshassa el.

Egyéb információk:
- A termék véralvadásgátló anyagot tartalmaz. Lenyelés esetén — adott esetben késleltetve jelentkező — tünetek közé tartozhat például az orrvérzés és a fogínyvérzés. Súlyos esetekben bőrbevérzés, véres vizelet vagy széklet is előfordulhat.
- Ellenszer: Kizárólag orvos, illetve állatorvos által beadott K1-vitamin.

Továbbá: - Bőrrel való érintkezés esetén mossa le a bőrt vízzel, majd vízzel és szappannal.
- Szembe kerülés esetén: Óvatosan öblítse ki a nyitott szemet. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben a környen megoldható. Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel.
- Szájba kerülés esetén gondosan öblítse ki a szájat vízzel. Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon szájon át. Tilos hányatni! Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát vagy címkéjét. Ha háziállat nyeli le a termméket, forduljon állatorvoshoz
- Veszélyes a vadon élő állatokra.

Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert és csalétekállomást veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni. Az irtószer összegyűjtésekor védőkesztyű viselése ajánlott.

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. A doboz zárva és a közvetlen napfénytől védve tárolandó. Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.

Szavatossági idő: 24 hónap

A késleltetett hatásmechanizmus miatt a véralvadásgátló rágcsálóirtó a csalétek elfogyasztása után 4-10 nappal váltja ki hatását. A rágcsálók betegséget hordozhatnak. Eltávolításuk során az elpusztult rágcsálókat ne érintse meg puszta kézzel, használjon keszlyűt vagy egyéb eszközt, például fogót. A termék keserű anyagot és festékanyagot tartalmaz.

TOXBOX Brodifakum hatóanyag tartalmú rágcsálóirtó pép + egéretető csalétekállomás

A doboz tartalma:
2 db egérdoboz
1 db 150 grammos MURIN EXTREME rágcsálóirtó pép
1 pár gumikesztyű
1 db kulcs

TOXBOX Brodifakum hatóanyag tartalmú rágcsálóirtó pép + egéretető csalétekállomás

A doboz tartalma:
2 db egérdoboz
1 db 150 grammos MURIN EXTREME rágcsálóirtó pép
1 pár gumikesztyű
1 db kulcs

TOXBOX Brodifakum hatóanyag tartalmú rágcsálóirtó pép + egéretető csalétekállomás

MURIN EXTREME RÁGCSÁLÓIRTÓ PÉP
Felhasználásra kész rágcsálóirtó pép.
Felhasználási terület: beltéri és kültéren épületek körül. Lakossági felhasználók és szakképzett foglalkozásszerű felhasználók részére.

TERMÉKJELLEMZŐK:
MURIN EXTREME RÁGCSÁLÓIRTÓ PÉP:
0,0025 % **BRODIFAKUM** (CAS-szám: 56073-10-0) hatóanyagú, felhasználásra kész rágcsálóirtó csalétek, mély hatásos egerek és patkányok ellen.
A veszélyességet meghatározó összetevők: Brodifakum

FIGYELEM
FIGYELMEZTETŐ MONDATOK:
H373 Ismételtadó vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (vér).
ÓVINTEZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK:
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P103 Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN:
Azonnal forduljon orvoshoz.
P501 A tartalom elhelyezése hulladékként:
A helyi előírásoknak megfelelően.
A hulladék elhelyezése a 225/2015 (VIII.7.) korm. rendeletben foglaltak szerint történik.
Biocid terméktípus: PT14
Termék minősítése: III. forgalmi kategóriájú irtószer
NNK engedélyszám: HU-2019-MA-14-00244-0000
Engedélytulajdonos: Vebi Istituto Biochimico s.r.l. (Borgoricco, Olaszország)

Forgalmazó: Irto Trió Kft.
1116 Budapest, Sáfrány utca 37.
Tel.: +36 1 315 0420, Email: office@irtotrio.hu

Baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz!
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
telefonszáma: 06 80 80 11 99.
Bővebb információ a doboz belsejében.

CSALÉTEKÁLLOMÁS
Gazdaságosan és biztonságosan használható műanyag monitoring eszköz. A termékhez mellékelt saját kulccsal biztonságosan zárható, ezáltal megelőzhető, hogy az irtószerhez illetéktelenek hozzáférjenek. Ha valamilyen baleset folytán előfort a termék teteje, nem kell az egészet újra vásárolni, elég, ha csak azt cseréli.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
A csalétekállomás az illetéktelen hozzáférést megakadályozó kulccsal biztonságosan nyithető, zárható.
Helyezze a rágcsálóirtó pépet a dobozba. Viseljen védőkesztyűt elhelyezés közben. Elhelyezés közben ne egyen, ne igyon, és ne dohányozzon. Az elhelyezést követően zárja le a dobozt, kattanásig. Az elhelyezés után alaposan mossa meg a kezét meleg szappanos vízzel.

LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS:
Célszervezetek: Rattus norvegicus (Vándorpatkány) Fiatal és ivarérett egyedek.
Mus musculus (Házi egér) Fiatal és ivarérett egyedek

Felhasználási terület:
Házi egerek: beltéri
Patkányok: beltéri és kültéren épületek körül

Csalétek alkalmazása:
Házi egerek irtásához 50 g csalétek/csalétekállomás;
patkányok irtásához 150 g csalétek/csalétekállomás

Házi egerek: 50 g csalétek csalétekállomásonként. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek (kis mértékű fertőzöttség esetén) vagy legalább 2 méternek (nagymértékű fertőzöttség esetén) kell lennie.
Egerek irtásakor az etetőállomásoknál a kezelés kezdetén legalább 2-3 naponta, majd később hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.
Patkányok: 150 g csalétek csalétekállomásonként. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 10 méternek (kis mértékű fertőzöttség esetén) vagy legalább 5 méternek (nagymértékű fertőzöttség esetén) kell lennie. Patkányok irtásakor az etetőállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.

Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások:
- Használata előtt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelt vagy az értékesítéskor átadott összes információt.
- A mérgezett csalétek kihelyezése előtt mérlegeljük, hogy a tapasztalt rágcsálóártalom irtószer alkalmazása nélkül nem oldható-e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértékű egérártalom felszámolására).
- Távolítsa el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékot). Ettől eltekintve, közvetlenül a kezelés előtt ne bolygassa a területet, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.
- Az etetőállomásokat annak a helynek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol rágcsálói aktivitást figyeltek meg (például vonulási útvonalak, lészkek, lyukak, üregek stb).
- Ahol lehetséges, az etetőállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.
- Az etetőállomásokat gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb nem célzott állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezze el.
- Az etetőállomásokat élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezze el.
- Az etetőállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezze ki. Az etetőállomásokat ne helyezze el vízelvezető rendszerek közelében, ahol víz érheti azokat.
- Cseréljen ki az etetőállomásban minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált, vagy amely elszennyeződött.
- A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termék alkalmazása után mosson kezet, és mossa meg a termékkel közvetlenül érintkező bőrfelületet.
- A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó csalétket vagy az etetőállomásokat. A csalétek összegyűjtésekor kerülje az irtószer bőrrel való érintkezését.
- Kiszerelésre vonatkozó külön előírás: tasakos kiszerelések esetén a tasakokat ne nyissa fel, felnyitás nélkül kell kihelyezni.

Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések:
Használat előtt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelt vagy az értékesítéskor átadott összes információt.
- Végezzen előzetes felmérést a csalétek alkalmazásáról a fertőzött területen, valamint helyszíni vizsgálatot a rágcsáló fajok, aktivitási területük, valamint a fertőzöttség legvalószínűbb okának és mértékének meghatározása érdekében.
- Távolítsa el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékot).

Csalétek alkalmazása:
Házi egerek irtásához 50 g csalétek/csalétekállomás;
patkányok irtásához 150 g csalétek/csalétekállomás

Házi egerek: 50 g csalétek csalétekállomásonként. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek (kis mértékű fertőzöttség esetén) vagy legalább 2 méternek (nagymértékű fertőzöttség esetén) kell lennie.
Egerek irtásakor az etetőállomásoknál a kezelés kezdetén legalább 2-3 naponta, majd később hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.
Patkányok: 150 g csalétek csalétekállomásonként. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 10 méternek (kis mértékű fertőzöttség esetén) vagy legalább 5 méternek (nagymértékű fertőzöttség esetén) kell lennie. Patkányok irtásakor az etetőállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.

Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások:
- Használata előtt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelt vagy az értékesítéskor átadott összes információt.
- Végezzen előzetes felmérést a csalétek alkalmazásáról a fertőzött területen, valamint helyszíni vizsgálatot a rágcsáló fajok, aktivitási területük, valamint a fertőzöttség legvalószínűbb okának és mértékének meghatározása érdekében.
- Távolítsa el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékot).

SZAKKÉPZETT FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÁS:
Célszervezetek: Rattus norvegicus (Vándorpatkány) Fiatal és ivarérett egyedek Mus musculus (Házi egér) Fiatal és ivarérett egyedek

Felhasználási terület:
házi egerek és patkányok: beltéri és kültéren épületek körül
patkányok: kültéri nyílt területek, hulladéklerakókban

Csalétek alkalmazása - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek

Házi egerek irtásához 50 g csalétek/csalétekállomás; patkányok irtásához 200 g csalétek/csalétekállomás
Házi egerek irtásakor 50 g csalétek/csalétekállomás. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek (kis mértékű fertőzöttség esetén) vagy legalább 2 méternek (nagymértékű fertőzöttség esetén) kell lennie.
Egerek irtásakor az etetőállomásoknál a kezelés kezdetén legalább 2-3 naponta, majd később hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.
Patkányok irtásakor 200 g csalétek/csalétekállomás. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 10 méternek (kis mértékű fertőzöttség esetén) vagy legalább 5 méternek (nagymértékű fertőzöttség esetén) kell lennie.
Patkányok irtásakor az etetőállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat.
- Legalább az etetőállomások ellenőrzésének megfelelő gyakorisággal távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.
- Az elhullott rágcsáló testét védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összezedni, majd egy további zacskóba beletenni és összecsomózva lezárni. A dupla zacskóban levő testet zárt hulladéktároló edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik.

SZAKKÉPZETT FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÁS:
Célszervezetek: Rattus norvegicus (Vándorpatkány) Fiatal és ivarérett egyedek Mus musculus (Házi egér) Fiatal és ivarérett egyedek

Felhasználási terület:
házi egerek és patkányok: beltéri és kültéren épületek körül
patkányok: kültéri nyílt területek, hulladéklerakókban

Csalétek alkalmazása - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek

Házi egerek irtásához 50 g csalétek/csalétekállomás; patkányok irtásához 200 g csalétek/csalétekállomás
Házi egerek irtásakor 50 g csalétek/csalétekállomás. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek (kis mértékű fertőzöttség esetén) vagy legalább 2 méternek (nagymértékű fertőzöttség esetén) kell lennie.
Egerek irtásakor az etetőállomásoknál a kezelés kezdetén legalább 2-3 naponta, majd később hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.
Patkányok irtásakor 200 g csalétek/csalétekállomás. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 10 méternek (kis mértékű fertőzöttség esetén) vagy legalább 5 méternek (nagymértékű fertőzöttség esetén) kell lennie.
Patkányok irtásakor az etetőállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.
- Legalább az etetőállomások ellenőrzésének megfelelő gyakorisággal távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.
- Az elhullott rágcsáló testét védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összezedni, majd egy további zacskóba beletenni és összecsomózva lezárni. A dupla zacskóban levő testet zárt hulladéktároló edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik.

SZAKKÉPZETT FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÁS:
Célszervezetek: Rattus norvegicus (Vándorpatkány) Fiatal és ivarérett egyedek Mus musculus (Házi egér) Fiatal és ivarérett egyedek

Felhasználási terület:
házi egerek és patkányok: beltéri és kültéren épületek körül
patkányok: kültéri nyílt területek, hulladéklerakókban

Csalétek alkalmazása - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek

Házi egerek irtásához 50 g csalétek/csalétekállomás; patkányok irtásához 200 g csalétek/csalétekállomás
Házi egerek irtásakor 50 g csalétek/csalétekállomás. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek (kis mértékű fertőzöttség esetén) vagy legalább 2 méternek (nagymértékű fertőzöttség esetén) kell lennie.
Egerek irtásakor az etetőállomásoknál a kezelés kezdetén legalább 2-3 naponta, majd később hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.
Patkányok irtásakor 200 g csalétek/csalétekállomás. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 10 méternek (kis mértékű fertőzöttség esetén) vagy legalább 5 méternek (nagymértékű fertőzöttség esetén) kell lennie.
Patkányok irtásakor az etetőállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.
- Legalább az etetőállomások ellenőrzésének megfelelő gyakorisággal távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.
- Az elhullott rágcsáló testét védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összezedni, majd egy további zacskóba beletenni és összecsomózva lezárni. A dupla zacskóban levő testet zárt hulladéktároló edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik.