

# 2xEDmini csomagolás stanc méret: 446x302mm

2022.03.29.

- Számba kerülés esetén gondosan öblítse ki a száját vízzel. Önudatlan személynék soha semmit ne adjon szájon át Tilos hányni!!! Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát vagy címkéjét.  
- Ha használat nyitja le a terméket, forduljon állatorvoshoz.  
- Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni”; rágcsálóirtó tartalmaz: „termék neve és az engedély száma”, „hatóanyag(ok)” és „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz. (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)  
- Veszélyes a vadon élő állatokra.

A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások:  
- Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert és csalétekállomást veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvétele helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.  
- irtószert összegyűjtésekor védőkesztyű viselése ajánlott.

**Tárolási feltételek és eltarthatósági idő:**  
- Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolandó.  
- A doboz zárva és a közvetlen napfénytől védve tárolandó.  
- Gyermek, madarak, háziállatok és hasonlók számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.  
- Szavatossági idő: 24 hónap

**Egyéb információk:**  
- A készíttelt hatásmechanizmus miatt a véralvadást gátló rágcsálóirtó a csalétek elfogyasztása után 4-10 nappal váltja ki hatását.  
- A rágcsálók betegségét hordozhatnak. Eltávolításuk során az elpusztult rágcsalókat ne érintse meg pusztán kézzel, használjon kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót.  
- A termék keserű anyagot és festékanyagot tartalmaz.

**Baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz!**  
**Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat**  
telefonszáma: 06 80 80 11 99

Bővebb információ a doboz belsejében.



## EGÉRDÓBOZ ROBAN 25 rágcsálóirtó péppel

A doboz tartalma:  
2 db egérdoboz  
1 db 150 grammos  
ROBAN 25 rágcsálóirtó pép  
1 pár gumikesztyű  
1 db kulcs

## TOXBOX Difenakum hatóanyag tartalmú rágcsálóirtó pép + egéretető csalétekállomás

### 2db EGÉRDÓBOZ 1 db 150gr ROBAN 25 rágcsálóirtó pép



A doboz tartalma:  
2 db egérdoboz  
1 db 150 grammos ROBAN 25 rágcsálóirtó pép  
1 pár gumikesztyű  
1 db kulcs



## TOXBOX Difenakum hatóanyag tartalmú rágcsálóirtó pép + egéretető csalétekállomás

### 2db EGÉRDÓBOZ ROBAN 25 rágcsálóirtó péppel



A doboz tartalma:  
2 db egérdoboz  
1 db 150 grammos  
ROBAN 25 rágcsálóirtó pép  
1 pár gumikesztyű  
1 db kulcs



2db  
EGÉRDÓBOZ  
1db 150gr ROBAN 25  
rágcsálóirtó pép



## TOXBOX Difenakum hatóanyag tartalmú rágcsálóirtó pép + egéretető csalétekállomás

### ROBAN 25 RÁGCSÁLÓIRTÓ PÉP

Felhasználásra kész rágcsálóirtó csalétek lakossági felhasználók részére. Belső, kültéri, illetve kültéri épületek körül történő felhasználásra.  
Tilos a készítményt nem célszervezeti állatok elpusztítására használni! Ne juttassa a készítményt élővízbe.

Bioicid termék típus: PT14  
UFU: TE00-E048-6004-Q08FS (Roban 25 rágcsálóirtó pép)

**TERMÉKJELLEMZŐK:**  
ROBAN 25 RÁGCSÁLÓIRTÓ PÉP: 0,002% % DIFENAKUM (CAS szám: 56073-07-5) hatóanyagú, felhasználásra kész rágcsálóirtó csalétek, mely hatásos egerek és patkányok ellen. A veszélyességét meghatározó összetevők: Difenakum (ISO)

**FIGYELMISZERTELTETŐ MONDATOK:**  
H373 – Irritáló vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szöveteket (vér).  
P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.  
P103 – Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.  
P220 – Ruhától és más éghető anyagoktól távol tartandó.  
P261 – Szembe, bőre vagy ruhára nem kerülhet.  
P270 – A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.  
P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijuttatását.  
P280 – Védőkesztyű használatát kötelező.  
P301 + P310 – LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz.  
P404 – Zárt edényben tárolandó.  
P405 – Elzárva tartandó.  
P501 – A tartalom elhelyezése hulladékként: A nemzeti előírásoknak megfelelően.

**Forgalmazó: Irtó Trio Kft.**  
1116 Budapest, Sárány utca 37.  
Tel.: +36 1 315 0420, Email: office@irtotrio.hu

**Engedélyes:** PelGar International Limited (Lyon, Franciaország)  
Bioicid engedélyszám: HU-2016-SP-14-00170-0000

Bővebb információ a doboz belsejében.

**CSALÉTEKÁLLOMÁS**  
Gaszágosan és biztonságosan használható műanyag monitoring eszköz. A termékhez mellékelt saját kulccsal biztonságosan zárható, ezáltal megelőzhető, hogy az irtószert az illetéktelenek hozzáférjék. Ha valamilyen baleset folytán eltört a termék teste, nem kell az egészét újra vásárolni, elég, ha csak azt cseréli.

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**  
A csalétekállomás az illetéktelen hozzáférést megakadályozó kulccsal biztonságosan nyitható, zárható. Helyezze a rágcsálóirtó pépet a dobozba. Viseljen védőkesztyűt elhelyezés közben.  
Elhelyezés közben ne egyen, ne igyon, és ne dohányozzon. Az elhelyezést követően zárja le a dobozt, kattantasság. Az elhelyezés után alaposan mossa meg a kezét meleg szappanos vízzel.

### Használati utasítás:

- Használat előtt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelt vagy az értékesítéskor átadott összes információt.

- A mérgezett csalétek kihelyezése előtt mérlegeljük, hogy a tapasztalt rágcsálótípus irtószert alkalmazása nélkül nem oldható-e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértékű egérirtalom felszámolására).

- Távolítsa el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kijomlott gabonát vagy élelmiszer-hulladékok). Ettől eltekintve, közvetlenül a kezelés előtt ne bolygassa a területet, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.

- Az etetőállomások annak a helynek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol rágcsálói aktivitást figyeltek meg (például vonulási útvonalak, fészkek, lyukak, tregék stb.).

- Ahol lehetséges, az etetőállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezetekhez kell rögzíteni.

- Az etetőállomások elhelyezésétől, kitalálási és takarmánytól, valamint ezekről érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezze el.

- Az etetőállomásokot ne helyezze el vízelvezető rendszerek közelében, ahol víz érhető azokra.

- A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termék alkalmazása után mosson kezet, és mossa meg a termékkel közvetlenül érintkező bőrfelületét.

- A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó csalétek vagy az etetőállomásokat.

- Kiszerezésre vonatkozó külön előírás: tasakos kiszerelések. A tasakokat ne nyissa fel, felnyitás nélkül kell kihelyezni.

Célszervezetek: Mus musculus (házi egér) fiatal és ivarérett egyedek.  
Felhasználási terület: beltéri.

Egerek irtásakor legfeljebb 40 g csalétek/etetőhely. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 2 méternek (nagy mértékű fertőzöttség esetén) vagy 5 méternek (kis mértékű fertőzöttség esetén) kell lennie. Az etetőállomásoknál a kezelés kezdetén legalább 2-3 napon, majd később hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétek elfogyaszta-e az etetőállomások epeit, és valamint el kell távolítani az elhullott rágcsalókat. Szükség esetén pótolja a csalétek.

Célszervezetek: Rattus norvegicus (vándorpatkány) fiatal és ivarérett egyedek. Felhasználási terület: beltéri.  
Legfeljebb 200 g csalétek csalétekállomásonként. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie.

Az etetőállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétek elfogyaszta-e az etetőállomások epeit, és valamint el kell távolítani az elhullott rágcsalókat. Szükség esetén pótolja a csalétek.

Célszervezetek: Rattus norvegicus (vándorpatkány) fiatal és ivarérett egyedek.

Felhasználási terület: kültéri, kültéri épületek körül.  
Legfeljebb 200 g csalétek csalétekállomásonként. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie.

**Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások:**  
- Az etetőállomásokot csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezze ki.  
- Cseréljen ki az etetőállomásokban minden olyan csalétek, amelyet a víz megromgált vagy amely esztergynyűzött.

- Az etetőállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétek elfogyaszta-e az etetőállomások epeit, és valamint el kell távolítani az elhullott rágcsalókat. Szükség esetén pótolja a csalétek.

**Kockázatsökkentő intézkedések:**  
- Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának elvonása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és kisebb kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újul a területen.

- Ne használjon tartósan véralvadást gátló rágcsálóirtó csalétek (például rágcsálók érzékszervi megjelölésére vagy rágcsálói aktivitás kimutatására).

- A termék megfelelő, zárt etetőállomásokban kell alkalmazni. Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni”; rágcsálóirtó tartalmaz: „termék neve és az engedély száma”, „hatóanyag(ok)” és „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz. (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99).

- A termék 35 napon belül elpusztítja a rágcsalókat.

- Amennyiben a kezelés nem tűnik hatékonyknak (azaz továbbra is rágcsálói aktivitás észlelhető), a felhasználónak a termék értékesítőjéhez vagy kártevőirtóhoz kell fordulnia.

Legfeljebb az etetőállomások ellenőrzésének megfelelő gyakorisággal távolítsa el a kezelést alatt elpusztult rágcsalókat.

- Az elhullott rágcsáló tetemet védőkesztyűben, kifordított műanyag zsákba segítségével kell összegyűjteni, majd egy további zacskóba beletenni a megjelölt rágcsálóirtó tetemet. A dupla zacskóban lévő tetemet zárt hulladékárló edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik.

Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása az elősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi ovintézkedések.

- A termék véralvadást gátló anyagot tartalmaz. Lenyelés esetén — adott esetben kezeléssel — tünetek közé tartozhat például a vérzés és a fogínyvérzés. Súlyos esetekben bőrvérzés, vese zizület vagy széklet is előfordulhat.

Ellenszer:  
Küzdőanyag orvos, állatorvos által beadott K1-vitamin. Továbbá: Bőrrel való érintkezés esetén mossa le a bőrt vízzel, majd vízzel és szappannal.

- Szembe kerülés esetén: ha a sérült kontaktlencsét visel, távolítsa el, majd néhány perccel az öblítésre a szemét a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel.