

TritoSec

BIOFA MADÁRTETŰATKA-IRTÓ SZUSZPENZIÓ

ÖSSZETEVŐK: SZILÍCIUM-DIOXID KOVAFÖLD



FIGYELEM

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (tüdő).
P260 A por/permet belélegzése tilos.
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.
EUH066 „Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.”

UFI: M300-P0FG-K00E-G91C

Engedélyszám: HU-2022-MA-18-00404-6001.

II. forgalmazási kategóriájú irtószer.

Biocid hatóanyag: 1000 g/kg (100 %) szilícium-dioxid (szilícium-dioxid/Kieselguhr). **Célorganizmusok (beleértve a fejlődési szakaszt is):** madártetű atka (Dermanyssidae – ivarérett egyedek és nimfák).

Terméktípus: PT18. **Az előállítás típusa:** WP - Nedvesíthető por.

Engedélyezett felhasználás: rovarirtó szer. **Felhasználási terület:** Beltéri – baromfitartó telepeken, ólakban, ketrecekben. **Felhasználói kör:** szakképzett felhasználó. **Alkalmazás:** Permetezés. A termékből munkaoldatot kell készíteni. A munkaoldat háti permetező segítségével vihető fel.

Adagolás: Munkaoldat: kb. 5 kg termék feloldása 25 liter vízben. 25 liter munkaoldat 100 m² felület kezeléséhez elegendő. Kezelések között leg-
alább 7 napnak kell eltelnie.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: Tartsa be a használati utasításokat! A terméket használat előtt és közben jól fel kell rázni. Alkalmazza általános felületkezelés formájában. Az egyenletes permetezés biztosítása érdekében a munkaoldatot 30-50 cm távolságra a felületről kell felvinni. Kezelje a réseket és repedéseket, üregeket és haladási útvonalakat, illetve az összes olyan területet, ahol atkák rejtőzhetnek vagy beléphetnek az épületbe. Permetezze a teljes felületet addig, amíg a termék fehér réteget képez a felületen megszáradás után. A termék kizárólag száraz állapotban fejti ki megfelelően a hatását. Megelőzés céljából: tiszta és száraz baromfióiban történő használat esetén az állatok megérkezése előtt. Kezelés céljából: fertőzött baromfióiban történő használat esetén, mikor az állatok az ólon kívül tartózkodnak. Ne használja permetezőláncsával végzett ömlesztett permetezéshez. Ne alkalmazza közvetlenül az állatokon, a termék kizárólag a felületek kezeléséhez alkalmas. A szükséges helyeken 7 nap elteltével alkalmazza újból a terméket. A nedves felületen történő alkalmazás késlelteti a termék hatását.

KOCKAZATCSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK: Csak üres állattartó épületben használható. A kezelés előtt távolítsa el az élelmiszereket. Fedje le az etetőket műanyag fóliával. Alkalmazás előtt takarja le az összes víztároló tartályt. Tilos közvetlenül alomra szórni. Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszereken, takarmányon, italon vagy azok közelében, továbbá olyan felületeken vagy eszközökön, amelyekkel élelmiszert, takarmánnyal, itallal és használatokkal közvetlenül érintkezhetnek. A kezelést megelőzően az élelmiszert el kell távolítani. Kizárólag csecsemők, gyermekek, házi kedvencek (egyéb nem célszervezetek) által nehezen megközelíthető és hozzáférhető helyeken használható. Ne alkalmazza illetéktelen személyek, különösen gyermekek vagy házi kedvencek jelenlétében. Nedves tisztítással távolítsa el a feleslegessé vált terméket és annak maradványait. A kezelés és a termék eltávolítása során nem szabad porszívózni. Légzésvédő felszerelés (RPE) (sisak/kármaza/álc vagy P3 hatékonyságú szűrővel ellátott teljes álc), védőruházat és védőkesztyű (gumikesztyű (EN ISO 374, anyagvastagság ≥ 0,5 mm, áttörési idő ≥ 480 perc)) használata kötelező.

A termék szilícium-dioxidot/kovaföldet tartalmaz, amelyre vonatkozóan inhalációs küszöbérték van érvényben a foglalkozásszerű felhasználók számára, és a termék kockázatértékelésének esetén is ezt a küszöbértéket használjuk.

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁS: Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás vízzel. Tünetek jelentkezése esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. LENYELÉS ESETÉN: Tünetek jelentkezése esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Tünetek jelentkezése esetén öblítse le vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. AMENNYIBEN ORVOSI ELLÁTÁS SZÜKSÉGES,

A TERMÉK CÍMKÉJE VAGY CSOMAGOLÁSA LEGYEN KÉZNÉL ÉS FORDULJON A TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: +36 80 20 11 99).

KÖRNYEZETVÉDELME: Szivárgás esetén torlaszolja el a nyílást. Állítsa el a szivárgást, amennyiben ez kockázat nélkül lehetséges. Akadályozza meg a vízvezető rendszerbe való bejutást. Akadályozza meg a felszíni vízbe való beszivárgást, illetve a talajba való behatolást.

HULLADÉKKEZELÉS: A készítmény a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és használható fel. A fel nem használt irtószer és maradéka, a szennyezett tárgyak mosóvíze és egyéb hulladékanyagok (pl. üres csomagolóanyagok, elhasznált kartonlapok) veszélyes hulladéknak minősülnek, ártalmatlanításáról a felhasználók a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

TÁROLÁS, ELTARTHATÓSÁG: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőző, közvetlen napfénytől, fagytól védett helyen tárolandó.

Gyártási szám és lejárat idő: lásd a bélyegzőn!
TS Sz-1/2023



5 999887 499418 >

10 kg

BIOFA
A member of the Andermatt Group

Engedélytulajdonos/Gyártó: Biofa GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 2, 72525 Münsingen, Németország
Telefon: +49 (0)7381/9354-0

IRTÓTRIO
www.irtotrio.hu

Forgalmazó: Irtó Trió Kft.
1116 Budapest, Sáfrány u. 37.
Telefon: 06 1-3150-420